

I. ВОЕННАЯ И ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИИ

УДК 616.89-008.441.13«2016/2018»(476.2-37Лоев)
**АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ПРОБЛЕМУ АЛКОГОЛИЗМА
В ЛОЕВСКОМ РАЙОНЕ ЗА 2016–2018 ГГ.**

Балашова В. Г., Цейко З. А., Шеремето М. В.

**Учреждение образования
«Гомельский государственный медицинский университет»
г. Гомель, Республика Беларусь**

Введение

Алкоголизм и его последствия являются актуальной медико-социальной проблемой современного общества, которая затрагивает практически все категории населения и ставит под угрозу как индивидуальное, так и государственное развитие. Алкоголь является третьим по значимости фактором риска преждевременной смерти, инвалидности и потери здоровья в мире [1]. По данным Всемирной организации здравоохранения за период 2016–2018 гг., наше государство занимало 15 позицию, со средним уровнем потребления в 11,5 л этилового спирта в год на душу населения в категории старше 15 лет, что является очень высоким показателем, по отношению к мировому сообществу государств [2]. На 2020 г. данный показатель сократился и составил 10,8 л этилового спирта в год на душу населения в категории старше 15 лет. Однако, несмотря на постепенные положительные изменения, крайне важно оценивать существующую обстановку и эффективность принимаемых мер.

Цель

Проанализировать проблему алкоголизма за 2018–2020 гг. на примере Лоевского района Гомельской области, в ходе чего изучить и сопоставить динамику данных наркологической службы УЗ «Лоевская ЦРБ».

Материал и методы исследования

Проведен ретроспективный анализ отчетов наркологической службы УЗ «Лоевская ЦРБ» за 2018–2020 гг. А также сравнительный анализ с общереспубликанскими данными по отдельным параметрам.

Результаты исследования и их обсуждение

Согласно проанализированным данным, детализированным в таблице 1, наименьший процент пьющего населения наблюдался в 2019 г. и составлял 5,21 % от общей численности населения Лоевского района. В 2018 и 2020 гг. данный процент практически идентичен. Однако, в 2020 г. наблюдается увеличение смертности от алкогольных отравлений на 2 человека. Безусловно, учитывая фактор небольшого количества населения, показатель смертности на 100 тыс. населения малоинформативен. При этом он более весомо выглядит на фоне абсолютных чисел естественного прироста, убыли населения, что говорит о существенной доле смертей от отравления этиловым спиртом в общей структуре смертности.

В 2018 г. суррогатами алкоголя со смертельным исходом отравилось 2 человека, в 2019 г. — 1 человек, в 2020 г. — 4 человека.

Среди лиц, умерших от алкогольного отравления на учете у врача-нарколога не состояли: в 2018 г. — 5 человек, в 2019 г. — 2 человека, в 2020 г. — 4 человека.

В 2018 и 2019 гг. алкогольный психоз перенесли по 1 человеку за год, в 2020 г. — 3 человека.

Таблица 1 — Результаты анализа отчетов наркологической службы за 2018 – 2020 гг.

Год	Состоит на учете	Численность населения	Процент на душу населения (%)	Смертность/на 100 тыс. населения	Естественный прирост, убыль (-) [3, 4]
2018	696	11 524 чел.	6,04	9 /78	- 98
2019	608 (-88)	11 657 чел.	5,21	7 /60	- 4 (январь-март)
2020	703 (+95)	11 629 чел.	6,05	11 /94	- 44 (январь-март)

На основании данных таблиц 2–4 заметно некоторое преобладание смертности среди сельского населения, что отличается от общереспубликанских показателей, однако в условиях небольшой численности населения может являться допустимым. Кроме того, явно выделяется количество трудоустроенных людей, которые находятся в трудоспособном возрасте, составляет максимально 50 % среди мужчин и 50 % среди женщин в 2018 г., в последующих годах этот показатель значительно ниже, вплоть до 0 %.

Таблица 2 — Анализ смертности за 2018 г. по признакам

Пол	Трудоспособный возраст	Наличие места работы	Старше трудоспособного возраста	Сельский житель	Городской житель
М	4	2	2	4	1
Ж	2	1	1	4	0

Таблица 3 — Анализ смертности за 2019 г. по признакам

Пол	Трудоспособный возраст	Наличие места работы	Старше трудоспособного возраста	Сельский житель	Городской житель
М	2	Нет	3	3	2
Ж	1	Нет	1	2	0

Таблица 4 — Анализ смертности за 2020 г. по признакам

Пол	Трудоспособный возраст	Наличие места работы	Старше трудоспособного возраста	Сельский житель	Городской житель
М	5	1	1	5	1
Ж	3	нет	2	4	1

Выводы

Проведенное исследование показало, что уровень алкоголизации населения Лоевского района, несмотря на снижение уровня потребления этилового спирта в год на душу населения в категории старше 15 лет этанола в стране, сохраняется на высоком уровне. Анализ динамики выявил отсутствие положительных изменений и увеличение смертности от отравления алкоголем, что составляет заметную долю в естественной убыли населения. Одними из факторов риска смерти от отравления алкоголем и развития алкоголизма являются отсутствие места работы и низкий уровень культурной занятости.

ЛИТЕРАТУРА

1. Потребление алкоголя как фактор риска здоровью населения: обзор российских исследований / Н. А. Лебедева-Несебря [и др.] // Анализ риска здоровью. 2017. № 4. 160 с.
2. Total consumption with 95%CI by country. URL: <https://apps.who.int/gho/data/node.main.A1375>. Дата доступа 18.05.2022.
3. Статистический бюллетень «Естественное движение населения по Республике Беларусь за 2018 год». URL: <https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/86c/86cb33c5e90500549b96708cb0754049.pdf> Дата доступа 18.05.2022.
4. Статистический бюллетень «Число зарегистрированных родившихся, умерших, браков и разводов по Республике Беларусь» за январь – март 2020 г. URL: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_bulletin/index_16961/ Дата доступа 18.05.2022.