

А. Д. Лагун, О. А. Калининко

*Научный руководитель: к.м.н, доцент В. Н. Бортновский**Учреждение образования**«Гомельский государственный медицинский университет»**г. Гомель, Республика Беларусь***ОЦЕНКА СКЛОННОСТИ ПОДРОСТКОВ К СУИЦИДАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ*****Введение***

Суицид представляет собой результат действия, преднамеренно начатого и совершенного человеком с полным знанием или ожиданием фатального исхода. Суицид, как явление, относится не только к зрелому населению, но и к лицам молодого возраста, детям и подросткам, причем именно молодые люди чаще совершают попытки суицида [1, 2].

К сожалению, Республика Беларусь занимает не последнее место по показателям подросткового суицида, что является актуальной проблемой современности. Показатель смертности подростков от самоубийств в стране на 2018 год составлял 2,3 случая на 100 тыс. подростков возрастом 10–17 лет, однако в 2019 году значение данного показателя возросло до 3,5. Следует отметить, что для суицидальной активности подростков характерны как подъемы, так и спады [3].

Цель

Целью исследования явилась оценка склонности у подростков разных возрастных групп к суицидальному поведению посредством анкетирования.

Материал и методы исследования

В соответствии с поставленной целью исследования авторами была разработана анкета, которую предлагали пройти подросткам с помощью Интернет-ресурсов. Анкета основана на 20 вопросах, способствующих выявлению суицидальных склонностей. Полученные результаты заносилось в созданную форму Google Forms для обработки данных. Дальнейший анализ полученных результатов проводился с помощью Microsoft Office Excel.

Всего было анкетировано 300 респондентов возрастом до 18 лет, из которых 171 (57,0 %) респондент женского пола, 129 (43,0 %) – мужского. Средний возраст подростков составил 15 лет. Кроме того, в анкетировании приняли участие респонденты разных возрастных групп: 12–13 (20,0 %) лет, 14–15 (50,0 %) и 16–17 (30,0 %) лет. Характеристика возрастных групп респондентов представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристика возрастных групп анкетированных респондентов

Возрастная группа	Количество, n	Пол, М/Ж
Респонденты возрастом 12–13 лет	60	21/39
Респонденты возрастом 14–15 лет	150	63/87
Респонденты возрастом 16–17 лет	90	45/45

Результаты исследования и их обсуждение

В результате анализа полученных данных установлено, что 98 (65,3 %) респондента возрастом 14–15 лет чувствуют одиночество и отчаяние, из которых 60 (61,2 %) и 38 (38,8 %) лиц мужского и женского пола, соответственно. Однако, лишь 12,0 и 26,0 % подростков возрастом 12–13 и 16–17 лет дали положительный ответ на данный вопрос.

При исследовании у респондентов такого качества, как тревожность, были получены следующие данные: в 38,3%, 61,3% и 41,1% случаев респонденты возрастных групп 12–13, 14–15 и 16–17 лет, соответственно, отмечают у себя наличие тревожности. Полученные результаты в соответствии с полом представлены на рисунке 1.




Рисунок 1 – Наличие тревожности у анкетированных респондентов разных возрастных групп

Для оценки суицидальной склонности у респондентов анкета включала в себя вопросы на наличие фантазий о смерти и мыслей о нанесении себе самоповреждений. Было установлено, что 22 (14,6 %) респондента возрастом 14–15 лет подтвердили наличие данных фантазий и мыслей, среди которых большинство у лиц мужского пола. В то время как у респондентов возрастом 12–13 и 16–17 лет обнаружено лишь 10 (16,6 %) и 13 (14,4 %) данных случаев.

Выводы

В результате проведенного анкетирования и анализа полученных данных, обнаружено, что наиболее высокая склонность к суициду имеется у подростков возрастом 14–15 лет и лиц мужского пола. В связи с этим можно прийти к заключению о необходимости проведения профилактической работы с данной возрастной группой для предотвращения потенциальных суицидов. Исследование продолжается.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бушмелева, Н. Н. Оценка склонности студентов Удмуртской Республики к суициду / Н. Н. Бушмелева, А. С. Опалева, Е. П. Соколова // Проблемы современной науки и образования. – 2015. – № 12 (42). – С. 222–224.
3. Зиновский, В. И. Демографический ежегодник Республики Беларусь. Статистический сборник / В. И. Зиновский. – Минск, 2019. – 420 с.
2. Кирпиченко, А. А. Суицидальный риск среди подросткового населения г. Витебска / А. А. Кирпиченко, А. Н. Барышев // Психиатрия. – 2015. – № 9. – С. 91–96.

УДК 614:[61:351.777.61]:502

М. А. Малашенко, А. С. Капитонов

Научный руководитель: к.б.н., доцент И. В. Яблонская

Учреждение образования

«Гомельский государственный медицинский университет»

г. Гомель, Республика Беларусь

ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. ГОМЕЛЯ

Введение

Быстрые темпы урбанизации и современное развитие здравоохранения в стране настоятельно выдвигают для решения проблему утилизации отходов, образующихся в организациях здравоохранения. Эта проблема является важной эколого-гигиенической