ОСЛОЖНЕНИЯ ПРОТЕКАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОК

Дегтярёва А.В., Макаренко К.В., Каравацкая О.А., Дегтярёва Е.И.
Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Беларусь

COMPLICATIONS OF PREGNANCY IN HIV-INFECTED PATIENTS

Degtyareva A.V., Makarenko K.V., Karavatskaya O.A., Degtyareva E.I.
Gomel State Medical University, Gomel, Belarus

Цель: выявить наиболее часто встречающиеся осложнения во время беременности у ВИЧ-инфицированных пациенток и заболевания у новорожденных.

Материалы и методы. Проанализировали 100 медицинских карт ВИЧ-инфицированных беременных пациенток, находящихся на стационарном лечении. Основные заболевания при поступлении: хроническая плацентарная недостаточность, обвитие пуповины вокруг шеи плода, угроза преждевременных родов, маловодие, анемия, инфекционные заболевания мочеполовой системы.

Результаты. Выявили, что наиболее часто встречающимися осложнениями у ВИЧ-инфицированных беременных женщин были: лимфаденопатия (80%), хламидиоз (40%), орофарингеальный кандидоз (40%), хроническая плацентарная недостаточность (40%), трихомониаз (30%), также были пациентки с дополнительной вирусной инфекцией – вирусным гепатитом С (20%). Присоединение дополнительной инфекции разной этиологии во время беременности свидетельствует о значительном снижении иммунной защиты организма матери.

У новорожденных детей от ВИЧ-инфицированных матерей отмечали нарушения со стороны дыхательной системы – пневмоцистную пневмонию (у 80%); со стороны сердечно-сосудистой системы – дополнительную хорду в области левого желудочка, межпредсердное сообщение, открытый артериальный проток (у 100%); со стороны центральной нервной системы – ВИЧ-ассоциированную энцефалопатию (у 70%) и внутриутробные инфекции без дополнительного уточнения (у 80%).

Если не принимать мер профилактики передачи вируса от матери ребенку, вероятность инфицирования ребенка составит 25-40%. Употребление антиретровирусных препаратов женщиной до беременности и во время беременности, проведение планового кесарева сечения и отказ от грудного вскармливания снижают риск передачи инфекции ребенку менее 2%.

Вывод. Согласно полученным данным, наиболее часто встречающееся осложнение у ВИЧ-инфицированных пациенток с беременностью – лимфаденопатия (80%), а клинические проявления ВИЧ-инфекции у новорожденных детей – пневмоцистная пневмония, ВИЧ-ассоциированная энцефалопатия.