

растные группы 5–9 лет (33,6 %) среди мальчиков, 1–4 года (34,3 %) и 10–13 лет (35,7 %) среди девочек.

Также есть данные, свидетельствующие о том, что из 329 пациентов с инфекционной экземой, у 324 (98,5 %) данный диагноз был установлен впервые.

Выводы

1. Инфекционная экзема реже встречается у детей (29,3 %), чем у взрослых.
2. Городское население более подвержено данному заболеванию (0,03 %).
3. Девочки болеют чаще (57 %) и наиболее уязвимыми возрастными группами являются 1–4 года (34,3 %) и 10–13 лет (35,7 %).

ЛИТЕРАТУРА

1. Данилов, С. И., Нечаева О. С., Пирятинская А. Б. // Российский журнал кожных и венерических болезней. — 2005. — № 1. — С. 60–62.
2. Данилова, А. А. // Consilium medicum. — 1999. — № 4. — С. 165–168.
3. Гридасова, В. Д. Экзема // Журнал дерматовенерологии та косметології ім. М. О. Торсуєва. — 2011. — № 1–2 (24). — С. 32–38.
4. Кубанова, А. А. // Вестник дерматологии и венерологии. — 2008. — № 5. — С. 8–18.
5. Павлова, О. В. Экзема: Этиология, патогенез, клиника, диагностика и лечение: учеб пособие / О. В. Павлова. — М.: Книжный дом «Либроком», 2010. — С. 56–62.
6. Скрипкин, Ю. К. Экзема / Ю. К. Скрипкин, А. А. Кубанова // Кожные и венерические болезни. — М., 2009. — С. 220–235.

УДК 616.521-022.7(476.2)

ОЦЕНКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИНФЕКЦИОННОЙ ЭКЗЕМОЙ У ВЗРОСЛЫХ ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Полякова К. А., Дюбанова Е. В.

Научный руководитель: старший преподаватель Л. А. Порошина

Учреждение образования

**«Гомельский государственный медицинский университет»
г. Гомель, Республика Беларусь**

Введение

Экзема — аллергическое заболевание, реакция кожи на внешние и внутренние раздражители [3].

Инфекционная экзема — заболевание, проявляющееся воспалительной реакцией в эпидермисе и дерме, характеризуется полиморфной сыпью, продолжительно текущее, зачастую с рецидивами. Основные морфологические элементы: пузырек и мокнутие. Заболевание часто сопровождается зудом, что нарушает качество жизни пациентов [1].

Одним из широко распространенных заболеваний кожи, которым страдает от 2 до 10 % трудоспособного населения, а в индустриально развитых государствах до 20 %, является инфекционная экзема [3]. В урбанизированных и экологически неблагоприятных регионах аллергическая патология может достигать 50–60 % от общей заболеваемости [4].

Возникновение инфекционной экземы связано с повышенной чувствительностью кожи к микробным агентам, так же может начаться самостоятельно или на месте травмы, ожога, ссадины [2].

Цель

Провести статистический анализ заболеваемости экземой среди взрослых по Гомельской области и влияния пола и возраста.

Материал и методы исследования

Работа была выполнена на базе Гомельского областного клинического кожно-венерологического диспансера (ГОККВД). Был проведен анализ заболеваемости инфекционной экземой на основании отчета по случаям инфекционной экземы, зарегистрированных по Гомельской области за 2019 г. Объектом исследования являлись пациенты в возрастном диапазоне от 18 лет и старше.

Результаты исследования и их обсуждение

За период 2019 г. в отделение ГОКВД обратилось 1 217 пациентов, которым была диагностирована инфекционная экзема. Взрослое население составило 70,7 % (861 пациент), дети — 29,3 % (356 пациентов). Таким образом инфекционная экзема более часто диагностировалась у взрослых.

Среди взрослых пациентов с инфекционной экземой наблюдалось 809 пациентов из числа городского населения и 52 из числа сельского. Принимая во внимание, что на период 2019 г. городское население насчитывало 1 095 392 человека, а сельское — 314 498 человек [5], заболеваемость больных инфекционной экземой составила 0,74 на 1000 городского населения и 0,17 на 1000 сельского населения. Сельское население менее восприимчиво к данному заболеванию, так как в сельской местности лучше экологическая обстановка, меньше техногенное загрязнение окружающей среды, более низкая вариабельность аллергенов.

Женщин среди пациентов ГОКВД с диагнозом инфекционная экзема наблюдалось больше, чем мужчин (413 (52 %) — женщин и 396 (48 %) — мужчин).

В нашем исследовании женщины страдали несколько больше.

Мы проведем анализ распределения пациентов по полу и возрасту (таблица 1).

Таблица 1 — Распределение пациентов, болеющих инфекционной экземой по возрасту и полу среди городского населения (в %)

Возраст	Количество (n = 809)	
	мужской пол	женский пол
18–19	4 (1 %)	6 (1,5 %)
20–24	22 (5,6 %)	25 (6,1 %)
25–29	22 (5,6 %)	23 (5,6 %)
30–39	52 (13,1 %)	57 (13,8 %)
40–49	43 (10,9 %)	54 (13,1 %)
50 и старше	253 (63,9 %)	248 (60 %)

Инфекционная экзема, как среди мужчин, так и среди женщин чаще всего встречается в возрастной группе 50 лет и старше. Вторая по частоте встречаемости возрастная группа — 30–39 лет, а также 40–49 лет. Лица младше 30 лет страдали экземой гораздо реже — 5,6 % и меньше (таблица 1).

Выводы

1. Инфекционная экзема чаще встречается у взрослых.
2. Среди сельского населения данное заболевание встречается реже, чем среди городского.
3. Возрастная группа 50 лет и старше является наиболее подверженной такому заболеванию, как инфекционная экзема.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гридасова, В. Д. Экзема / В. Д. Гридасова, З. Ф. Кривенко // Журнал дерматовенерологии та косметологии ім. М. О. Торсуева. — 2011. — № 1–2 (24). — С. 28–31.
2. Детская дерматовенерология: учеб. для студ. учреждений высш. мед. проф. образования / И. А. Горланов [и др.]; под ред. И. А. Горланова. — М.: Академия, 2012. — 352 с.
3. Порошина, Л. А. Особенности клинических проявлений инфекционной экземы, подходы к выбору антибиотикотерапии / Л. А. Порошина // Проблемы здоровья и экологии. — 2015. — № 3 (45). — С. 38–41.
4. Данилов, С. И. Медико-социальные факторы риска обострений хронических дерматозов / С. И. Данилов, О. С. Нечаева, А. Б. Пирятинская // Российский журнал кожных и венерических болезней. — 2005. — № 1. — С. 60–62.
5. Численность населения на 1 января 2019 г. и среднегодовая численность населения за 2018 год Гомельской области в разрезе районов, городов, поселков городского типа [Электронный ресурс] // Национальный статистический комитет Республики Беларусь. — Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/public_bulletin/index_13319/. — Дата доступа: 29.03.2019.