

УДК 613.888.151.2:614.2-055.2

**ПРОБЛЕМАТИКА ОТНОШЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
К ИСКУССТВЕННОМУ ПРЕРЫВАНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ
ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ**

Беляцкий В. С., Бауман Н. А.

Научный руководитель: к.б.н., доцент Н. Е. Фомченко

**Учреждение образования
«Гомельский государственный медицинский университет»
г. Гомель, Республика Беларусь**

Введение

Вопрос о проведении искусственного прерывания беременности (аборта) набирает всё большую актуальность в наши дни как с этической, так и непосредственно медицинской точек зрения, а также является объектом споров медицинских специалистов, общественности, религиозных конфессий. Аборт проводится по желанию женщины, а в отношении несовершеннолетней только при наличии письменного согласия ее законного представителя при сроке беременности не более 12 недель, в то же время допускается при наличии социальных показаний, определяемых Советом Министров Республики Беларусь, и желания женщины при сроке беременности не более 22 недель (Закон РБ о здравоохранении, Ст. 27 2435–XII от 18.06.1993 г).

Показаниями могут являться наличие у плода врожденных аномалий развития несовместимых с жизнью или сочетание аномалий развития с неблагоприятным прогнозом как для жизни и здоровья женщины, так и плода, приводящих к стойкой потере функций организма, вследствие тяжести и объема поражения при отсутствии методов эффективного лечения, а также выявленные хромосомные нарушения [1]. Для выявления подобных патологий используются пренатальные, неинвазивные или малоинвазивные методы исследования, инструментальные методы исследования на протяжении всего периода беременности, отбор групп риска [2].

Цель

Исследовать проблематику отношения разных возрастных групп населения к проведению искусственного прерывания беременности по медицинским показаниям, рождению ребёнка с врождённой генетической патологией.

Материал и методы исследования

На базе интернет-ресурса «<https://my.surveio.com/>» проводилось открытое анкетирование жителей города Гомеля в количестве 100 респондентов (из них 75 женщин и 25 мужчин) в возрастной группе от 17 до 37 лет. Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием компьютерных программ «Microsoft Excel» и «Statsoft Statistica». Анализ проводился с использованием анкеты составленной авторами работы.

Результаты исследования и их обсуждение

В ходе проводимого анкетирования из 100 респондентов: 74,8 % — не замужем/холосты, 23,3 % — замужем/женаты, 1,9 % — в разводе.

Из опроса было выявлено, что для 28,2 % анкетированных основным источником информации о проведении аборт является интернет.

По результатам анкеты 67 % опрошенных положительно отнеслись к проведению аборт в связи с нежелательной беременностью. Причинами данного решения считают: 70,9 % — врожденное заболевание ребенка, 35 % — тяжелое финансовое положение, 32 % — неготовность стать родителем, 9,7 % — по своим причинам.

Из опроса было выявлено: 51,5 % согласны, что аборт могут причинить вред здоровью женщины, 33 % допускают такую возможность, но считают, что данный риск оправдан, 9,7 % считают, что риск для здоровья минимален в связи с достижениями современной медицины, 5,8 % затруднились ответить.

Искусственное прерывание беременности является медицинским вмешательством, которое имеет свои показания и противопоказания. Большинство опрошенных: 84,5 % осведомлены о проведении абортов по медицинским показаниям и способах их проведения, 12,6 % считают, что им требуется больше информации по данному вопросу, 2,9 % не осведомлены вовсе.

На основании предыдущих результатов перед респондентами был поставлен вопрос: «Если бы в ходе беременности выяснилось, что плод имеет генетические заболевания и скорее всего ребёнок будет инвалидом, какое решение Вы бы приняли?» Исходя из данного вопроса: 54,4 % решили прервать беременность, 34 % затруднились ответить, 11,7 % решили сохранить текущую беременность и проводить реабилитацию и лечение патологии насколько это возможно.

Причинами для сохранения беременности с высоким шансом врожденной патологии опрошенные считают: 50,5 % — стабильное экономическое положение для возможности воспитания ребёнка-инвалида, 27,2 % — по своим причинам, 22,3 % — в связи с религиозными убеждениями.

Анкетирование показало, что большинство респондентов недостаточно осведомлены о проведении абортов, показаниях и возможных осложнениях после их проведения. Из всех опрошенных 83,5 % считают, что данный вопрос необходимо освещать в обществе, 14,6 % не видят в этом необходимости, 1,9 % имеют собственное мнение по данному вопросу.

Выводы

Таким образом, проведенное исследование позволило установить, что уровень знания населения в вопросе искусственного прерывания беременности по медицинским показаниям находится на среднем уровне. Из чего следует, что для повышения уровня информированности и грамотности населения, необходимо комплексное освещение данного медицинского аспекта как в учебных учреждениях всех уровней, так и в средствах массовой информации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь [https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C21400088]. — Режим доступа: https://pravo.by/. — Дата доступа: 03.03.2021.
2. Safe abortion: technical and policy guidance for health systems/ WHO. — 2nd ed. — Department of Reproductive Health and Research; World Health Organization: IRIS, 2013. — 136 с.

УДК 616.36-002.1-053.31:[577:616.15-07]

АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ ПРИ НЕОНАТАЛЬНОЙ ЖЕЛТУХЕ

Бортновская Д. Ю., Буланова А. Д.

Научный руководитель: к.б.н., заведующая кафедрой И. А. Никитина

Учреждение образования

«Гомельский государственный медицинский университет»

г. Гомель, Республика Беларусь

Введение

Неонатальная желтуха — появление видимого желтушного окрашивания кожных покровов и слизистых новорожденного вследствие повышения уровня общего билирубина в сыворотке крови. Существует разные классификации неонатальных желтух. Выделяют физиологические (до 90 % желтух новорожденных) и патологические (10% всех желтух), наследственные и ненаследствен-