

А. О. Алисейко, В. И. Дымович

Научный руководитель: ассистент Т. П. Пицко

Учреждение образования

«Гомельский государственный медицинский университет»

г. Гомель, Республика Беларусь

ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ СОСТОЯНИЯ ОТМЕНЫ АЛКОГОЛЯ С ДЕЛИРИЕМ

Введение

В большинстве случаев, состояние отмены алкоголя сопровождается соматической патологией – артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, алиментарно-токсическим гепатитом и многими другими состояниями, которые утяжеляют состояния пациентов, и, в некоторых случаях, могут спровоцировать развитие делирия. [1]. Поэтому, всем пациентам в состоянии отмены алкоголя с делирием, для оценки соматического статуса и выявления декомпенсаций хронических соматических заболеваний, необходимо проводить измерение артериального давления и частоты сердечных сокращений; измерение температуры тела; аускультацию, пальпацию; оценку неврологического статуса [2]. Электрокардиографическое исследование (с расшифровкой и интерпретацией данных) необходимо выполнить не позднее 24 часов от момента поступления пациентов в стационар, так как у большинства из них отмечается удлиненный интервал QT и аритмии, что обуславливает необходимость тщательного контроля за сердечной деятельностью [3].

Цель

Оценить частоту встречаемости сопутствующей патологии у пациентов с диагнозом: состояние отмены алкоголя с делирием

Материал и методы исследования

В ходе настоящего исследования методом случайной выборки был проведен ретроспективный анализ 200 медицинских карт стационарного пациента учреждения «Гомельская областная клиническая психиатрическая больница» с диагнозом: состояние отмены алкоголя с делирием, за период январь – декабрь 2022 год. Для оценки количественных показателей использовалась медиана (Me), первый и третий квартили [Q1; Q3]. Статистическая обработка данных производилась с помощью прикладного программного обеспечения Statistica 10.0 2011 года.

Результаты исследования и их обсуждения

В ходе исследования были сформированы 3 группы пациентов. В первую группу вошли пациенты в возрасте от 19 до 44 лет – 103 пациента (52 % от общего числа пациентов), медиана возраста составила 35 лет [32; 39]. Вторую группу составили пациенты от 45 до 59 лет – 76 пациентов (38 % от общего числа пациентов), медиана возраста составила 50 лет [48; 54]. В третью группу вошли пациенты возрастом от 60 до 74 лет – 21 пациент (10 % от общего числа пациентов), медиана возраста составила 66 лет [63; 68].

При анализе сопутствующей патологии в первой группе пациентов чаще других заболеваний встречались алиментарно-токсический гепатит – 12 (11,6 %) пациентов, артериальная гипертензия – 11 (10,6 %) пациентов, бытовые травмы различного генеза – 10 (9,7 %) пациентов. Подробная характеристика сопутствующей патологии в первой группе пациентов представлена на рисунке 1.




Рисунок 1 – Сопутствующая патология пациентов в возрасте от 19 до 44 лет

Анализ сопутствующей патологии во второй группе пациентов показал, что чаще других заболеваний встречается алиментарно-токсический гепатит – 16 (21 %) пациентов, артериальная гипертензия – 14 (18 %) пациентов, ишемическая болезнь сердца – 7 (9 %) пациентов, бытовые травмы различного генеза – 8 (10,5 %) пациентов, нарушения сердечного ритма – 6 (7,9 %). Подробная характеристика сопутствующей патологии второй группы пациентов представлена на рисунке 2.




Рисунок 2 – Сопутствующая патология пациентов в возрасте от 45 до 59 лет

У пациентов третьей группы из сопутствующей патологии чаще других встречались ишемическая болезнь сердца – 13 (61,9 %) пациентов, артериальная гипертензия – 9 (42,8 %) пациентов, алиментарно-токсический гепатит – 8 (38 %) пациентов. Подробная характеристика сопутствующей патологии третьей группы пациентов представлена на рисунке 3.




Рисунок 3 – Сопутствующая патология пациентов в возрасте от 60 до 74 лет

Выводы

Анализ частоты встречаемости сопутствующей патологии у пациентов с диагнозом состояние отмены алкоголя с делирием показал, что преимущественно у всех возрастных групп чаще других заболеваний встречается алиментарно-токсический гепатит, артериальная гипертензия, а также бытовой травматизм. У пациентов в возрасте от 45 лет и старше чаще встречается ишемическая болезнь сердца и нарушения сердечного ритма, что в очередной раз подтверждает необходимость использования электрокардиографического исследования для тщательного контроля за сердечной деятельностью.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ. Абстинентное состояние (синдром отмены) с делирием. Клинические рекомендации. Проект / Е. А. Брюн [и др.]. – 2018. – Т. 17, № 11. – С. 3–27.
2. Алкоголизм: руководство для врачей / Под ред. Н. Н. Иванца, М. А. Винниковой [и др.]. – М.:ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2011. – 856 с.
3. Delirium as a complication of the surgical intensive care / R. Horacek [et al.] / *Neuropsychiatr Dis Treat.* / Dove Medical Press Limited/ 2016 Sep 22.

УДК 616.891.6:378.6-057.875(476.2)

М. Е. Бобкова

*Научные руководители: старший преподаватель В. В. Концевая,
ассистент Я. В. Цвирко*

Учреждение образования

«Гомельский государственный медицинский университет»

г. Гомель, Республика Беларусь

ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ДЕПРЕССИИ И ТРЕВОЖНОСТИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Введение

Сегодня наша жизнь тесно связана со стрессом, давлением общества, недоброжелательностью, высоким уровнем нагрузки и способностью адаптироваться к данным