

ПАТОЛОГИЯ, АССОЦИИРОВАННАЯ С МИКОЗОМ ГЛОТКИ

Поддубный А.А., Шляга И.Д., Колчанова Н.Э., Межейникова М.О., Стома Е.А.
Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Республика Беларусь

PATHOLOGY ASSOCIATED WITH PHARYNGEAL MYCOSIS

Poddubny A.A., Shlyaga I.D., Kolchanava N.E., Miazheinikava M.O., Stoma E.A.
Gomel State Medical University, Gomel, The Republic of Belarus

Цель исследования: изучить характер соматической патологии при микозе глотки.

Материалы и методы. На базе медицинских государственных учреждений г. Гомеля: «Гомельская областная инфекционная клиническая больница» (ГУ «ГОИКБ»), «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека» (ГУ «РНПЦ РМиЭЧ»), «Гомельская областная туберкулезная клиническая больница» (ГУ «ГОТКБ») проведен ретроспективный анализ медицинских карт пациентов, находившихся на лечении в период с 2020 по 2022 гг. с различной соматической патологией. Изучены медицинские карты пациентов, которым было выполнено микроскопическое и микробиологическое исследование биологического материала из глотки.

Результаты и обсуждение. Всего за трехлетний период проанализировали 916 медицинских карт пациентов возрасте от 0 до 88 лет, находившихся на стационарном лечении в ГУ «ГОИКБ», ГУ «РНПЦ РМиЭЧ», ГУ «ГОТКБ» с общесоматической патологией. Выборка была репрезентативна по полу и возрасту. Все общесоматические заболевания, ассоциированные с грибковой инфекцией, были выделены в отдельную группу (Рис. 1). При анализе данной группы выявили, что большинство пациентов, имевших клинически значимый уровень колонизации грибами рода *Candida*, который составлял более 10^3 КОЕ/мл для полости рта и глотки, имели заболевания системы пищеварения в анамнезе (44,96%, $p < 0,05$).




Рис. 1. Структура соматической патологии, ассоциированной с грибковой инфекцией глотки.

При микроскопическом исследовании фарингеального секрета у всех пациентов был обнаружен псевдомицелий.

Выводы. Наличие фарингомикоза среди пациентов с патологией пищеварительной и эндокринной систем, заболеваниями крови является фактором, отягощающим течение основного заболевания. Следовательно, всем пациентам с соматической патологией целесообразно рекомендовать проведение микроскопического и микробиологического исследования

фарингеального секрета в качестве этапа первичной медицинской профилактики микоза глотки для своевременного персонифицированного подхода к диагностике и лечению.