

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАКА ЛЕГКОГО ПО ДАННЫМ ФИБРОБРОНХОСКОПИИ

¹В. В. Берещенко, ²А. Д. Борсук, ²Э. А. Надыров, ¹Н. Г. Шебушев,
¹В. Б. Богданович

¹УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель.
Беларусь

²ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека», г. Гомель,
Беларусь

Рак легкого на сегодняшний день является наиболее распространенной формой злокачественных опухолей у мужчин в Республике Беларусь. За прошедшее десятилетие количество случаев с данной патологией по Гомельской, Брестской и Гродненской областям увеличилось в 1,3 раза в сравнении с другими областями РБ [В.В. Жарков, И.В. Залуцкий, С.З. Фрадкин (2003)].

Врачам-эндоскопистам наиболее часто приходится встречаться с центральной формой рака легкого. Фибробронхоскопическое (ФБС) исследование на сегодняшний день остается наиболее информативным методом диагностики этой формы рака легкого. Оно позволяет диагностировать опухоль, определить границы распространения и получить материал для морфологической верификации диагноза.

Целью исследования явилось определение частоты центрального рака легкого при фибробронхоскопическом исследовании в неспециализированном стационаре.

Материалы и методы. Ретроспективно изучено 134 протокола фибробронхоскопии, выполненные в многопрофильном неспециализированном стационаре. Показанием к проведению исследования являлись подозрения на рак легкого и другие заболевания легких (затяжные пневмонии, хронические неспецифические заболевания легких и др.).

Было выявлено 14 (10,45 %) случаев центрального рака легкого. У всех пациентов были прямые эндоскопические признаки рака легкого – бугристые опухолевидные экзофитные образования различной формы, инфильтрации слизистой с неровной поверхностью, сужение просвета бронхов с ригидной стенкой. Из них мужчин – 13 (92,86 %), женщин – 1 (7,14 %). Средний воз-

раст больных составил 62,79 года. Самому молодому пациенту было 47 лет, наиболее старшему – 83 года. Поражение бронхов правого легкого встречалось у 8 пациентов (57,14 %), левого – 6 (42,86 %). Чаще других происходило поражение главных – 6 (42,86 %) и верхнедолевых бронхов – 4 (28,57 %).

Морфологический верифицирован диагноз во всех случаях. При этом плоскоклеточный рак разной степени дифференцировки встречался в 10 (71,43 %) случаях, adenокарцинома – в 2 (14,29 %), мелкоклеточный рак – в 2 (14,29 %).

Все пациенты после дополнительного обследования для дальнейшего лечения были переведены в специализированный стационар.

Таким образом, по данным нашего исследования, частота встречаемости центрального рака легкого у пациентов г. Гомеля, находившихся на лечении в терапевтическом отделении с различной легочной патологией, составляет 10,45 %. Среди заболевших преобладают пациенты мужского пола – 92,86 %. Преобладает поражение главного бронха – 42,86 %, независимо от стороны поражения. Морфологически преобладает плоскоклеточный рак легкого – 71,43 %.